



Prick test
+
breve consulto
specialistico

50€



Giornata della prevenzione

SCREENING ALLERGIE DA INALANTI

PER INFORMAZIONI
ADESIONI O PRENOTAZIONI

SANIRAD
Via J.F. Kennedy 3
33019 TRICESIMO (Ud)
Tel. 0432_854123 0432_851321
www.sanirad.it
sanirad@sanirad.it

Le allergie respiratorie

DEFINIZIONE

Le allergie respiratorie sono reazioni dovute ad una *risposta anomala del sistema immunitario* a sostanze volatili (allergeni) che entrano in contatto con l'organismo attraverso l'aria respirata.

CAUSE

Le allergie stagionali sono generalmente provocate dal polline e si verificano quindi in quei periodi dell'anno in cui fioriscono le piante.

Le allergie coniche sono provocate perlopiù da allergeni con cui si entra quotidianamente in contatto, per esempio, il pelo di animale, la polvere o le piume.

Di solito esiste una predisposizione familiare.



IL PRICK TEST

E' UN'INDAGINE DIAGNOSTICA ALLERGOLOGICA SEMPLICE E SICURA; PER QUESTO MOTIVO, IN GENERE, RAPPRESENTA L'ESAME DI PRIMA ISTANZA DI FRONTE AL SOSPETTO DI UN'ALLERGIA.

IL PRICK TEST VIENE EFFETTUATO ANCHE IN AMBITO PEDIATRICO A PARTIRE DALL'ANNO DI ETÀ, MENTRE NEI BAMBINI PIU' PICCOLI E' POCO UTILE PER LA SCARSA REATTIVITA' CUTANEA.

IL PRICK TEST VIENE FREQUENTEMENTE UTILIZZATO PER LO SCREENING DEGLI ALLERGENI DI ORIGINE ALIMENTARE O INALATORIA.

SINTOMI

Le allergie respiratorie possono manifestarsi con naso chiuso e/o con abbondante secrezione acquosa, starnuti, sibili respiratori, prurito nasale e agli occhi. Questi sintomi sono legati alla liberazione di istamina da parte del sistema immunitario.

L'istamina causa una serie di reazioni a catena, come edema, congestione nasale e aumento della produzione di muco.

DIAGNOSI

Una volta posta la diagnosi di reazione allergica (sulla base dei sintomi e di esami del sangue con la conta degli eosinofili), l'identificazione dell'agente che la provoca può essere effettuata con test cutanei (prick test, intradermoreazione) o sierologici (RAST)

COME SI ESEGUE

- Il prick test si esegue sulla cute della superficie flessoria dell'avambraccio; in caso di eczema o lesioni cutanee in tale sede e nei bambini più piccoli l'esame può essere eseguito sulla pelle del dorso.
- I punti sottoposti ad indagine vengono segnati con un pennarello. Sulla cute corrispondente viene quindi posta una goccia di estratto allergico diluito.
- Tale goccia viene attraversata da una lancetta sterile (un minuscolo spillo), fatto per penetrare per circa 1mm nell'epidermide (prick in inglese significa pungere)
- Dopo un minuto la goccia viene asportata con un pezzo di carta assorbente.
- Dopo 5-15 minuti si osserva la risposta cutanea al prick test. L'esame è considerato positivo se compare un pomfo di diametro uguale o superiore ai 3mm, circondato da un alone eritematoso (arrossamento), generalmente pruriginoso.